

# 吸入指導チェック報告書 (調剤薬局⇒刀根山病院FAX:06-6853-3127)

薬局名:  
店名:  
指導薬剤師名:



患者ID:  
患者名:  
担当医師:

## 発作治療薬 吸入指導チェック表

ID:

患者名:

用法用量:( 1回 吸入 )

基本は医師の指示どおり (1日8吸入まで)  
次の吸入まで4時間あけること  
発作時は20分間隔をあけて使用

メプチンエアー ・ サルタノール ・ アイロミール

指導日

			/	/	/	/	/
①薬の効果を説明							
②用法用量を説明							
③カウンターを確認 使用可能回数を説明		メプチンは 100 吸入 サルタノール・アイロミールは 200 吸入					
		(注意点)					
初回準備	④空噴霧	メプチンエアーは 2 回 アイロミールは 4 回空噴霧を行なう 1 週間以上使用していない場合も同様 サルタノールは不要					
吸入手順	⑤吸入器を振る	ガスと薬が均一に混ざるようしっかり振る					
	⑥息吐き	苦しくない程度に息を吐く					
	⑦吸入器をくわえる	吸入口を、軽く歯で噛んでくわえる					
	⑧薬の吸入	息を吸い込み始めると同時に 1 回ポンベを押して、 <b>ゆっくり深く</b> 吸いこむ					
	⑨息止め	苦しくない程度に <b>できるだけ長く止める</b> (5 秒程度)					
	⑩息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す					
	⑪1 回2吸入以上の場合は⑥～⑩を繰り返す						
	⑫うがい	必ず必要ではない					
⑬保管・お手入れの説明		ポンベに水をかけない					
		確認者名					

◎正しくできる

○できているが再確認必要

△できていない

補助資材



模擬薬と MEP-LEP

特記事項

Blank area for special notes.